

Precauzioni per via aerea (A)

Nelle malattie a trasmissione aerea la propagazione dei microrganismi avviene per disseminazione di nuclei di goccioline di diametro inferiore a 5 μm e di particelle di polveri contenenti l'agente infettivo. Queste rimanendo sospese nell'aria per lungo periodo possono essere disperse nell'ambiente anche lontano dal paziente-fonte e infettare soggetti suscettibili.

LE PRECAUZIONI PER VIA AEREA (A) NON SOSTITUISCONO MA SI AGGIUNGONO ALLE PRECAUZIONI STANDARD (S)



ACCOGLIERE IL PAZIENTE

- In degenza - Sistemare il paziente in una stanza di isolamento respiratorio a pressione negativa con deflusso dell'aria filtrato. L'isolamento, a seconda della disponibilità di reparto, può essere:
 - in stanza singola;
 - di coorte: un paziente infetto collocato nella stessa stanza assieme ad un paziente con la stessa infezione.
- In PS- Sistemare quanto prima il paziente nei locali di isolamento temporaneo presso l'accettazione oppure nella stanza di isolamento interna al PS.
- In ambulatorio - Sistemare quanto prima il paziente in una stanza per l'isolamento respiratorio; se questa non è disponibile, far indossare al paziente una mascherina chirurgica ed ospitarlo in una sala visita tenendo le porte chiuse.
- **La porta del locale di isolamento respiratorio deve rimanere sempre chiusa.**



EDUCARE IL PAZIENTE

- Educare il paziente ad indossare la mascherina chirurgica e a rispettare le norme di isolamento che riducono la trasmissione respiratoria fuori dalla stanza di isolamento, in particolare: restare in camera, in caso di attesa in ambienti frequentati da altre persone, usare la mascherina chirurgica e, quando possibile, mantenere una separazione spaziale da altri pazienti.



INFORMARE I VISITATORI

- All'esterno del locale in posizione sempre visibile deve essere affisso il cartello delle misure di isolamento specifiche per le malattie a trasmissione aerea (A).
- L'accesso dei visitatori deve essere regolato e tutti i visitatori devono essere informati prima di accedere alla stanza sulle norme igieniche da osservare durante la visita.



RESTRIZIONI PER L'OPERATORE

- Il personale suscettibile a morbillo, varicella, zoster diffuso, non dovrebbe mai entrare nella stanza di un paziente con una di queste infezioni se è in servizio personale immune.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

- Tutti i DPI devono essere cambiati tra un paziente e l'altro in caso di isolamento di coorte.
- Tutti i DPI devono essere rimossi e smaltiti dopo essere usciti dalla stanza ed aver chiuso la porta dietro di sé.



FACCIALI FILTRANTI

- L'operatore deve indossare il filtrante facciale FFP2, che deve coprire sia naso che bocca, prima di entrare nella stanza del paziente.
- Utilizzare filtranti facciali FFP3 quando le procedure da attuare possono determinare la produzione di aerosol.



TRASPORTARE IL PAZIENTE

- Limitare il trasporto e lo spostamento del paziente al di fuori della stanza. Quando si rende necessario, il degente deve essere trasportato con mascherina chirurgica correttamente calzata.
- Nei pazienti con lesioni cutanee da varicella o da *M. tuberculosis*, coprire le aree colpite in modo da prevenire il contatto delle lesioni con l'agente infettivo.
- Informare il servizio trasporti della presa in carico delle Precauzioni Standard (S).
- Solo durante il trasporto in ascensore l'accompagnatore suscettibile dovrà indossare il facciale filtrante FFP2.
- Se possibile, evitare la presenza di altri pazienti nello stesso ambiente fino all'isolamento in locale adeguato.
- Procedere alla sanificazione dei materiali utilizzati una volta terminato il trasporto.



GESTIRE L'AMBIENTE

- In PS - Quando viene utilizzato il locale di isolamento temporaneo, è necessario favorire il ricambio d'aria aprendo le finestre per non meno di un'ora prima di utilizzare nuovamente la stanza.
- Le precauzioni di contenimento devono essere specificate sull'agenda di reparto destinata agli operatori esterne, ad esempio gli addetti alle pulizie o consegna vitto ecc.



GESTIRE L'ESPOSIZIONE DEL PERSONALE

- Seguire le indicazioni sulla profilassi degli esposti fornite dalla Medicina del Lavoro e dallo Specialista di Malattie Infettive.

INTERROMPERE LE PRECAUZIONI PER VIA AEREA (A) DOPO LA RISOLUZIONE DI SEGNI E SINTOMI O IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI PER SPECIFICI MICRORGANISMI

Vedere anche la tabella riassuntiva TAB_MAL.INF allegata al documento "Policy aziendale sull'isolamento del paziente in Ospedale"