


Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sequenza per la rimozione

Di seguito viene presentata una tra le tecniche per la rimozione in sicurezza dei DPI al fine di ridurre il rischio di contaminazione biologica di vestiti, cute e mucose. In generale, i DPI devono essere rimossi prima di uscire dalla stanza, sulla porta di ingresso oppure nella zona filtro laddove presente, ad eccezione del facciale che deve essere rimosso dopo essere usciti dal locale e aver chiuso la porta.

1. GUANTI MONOUSO

- Sfilare il primo guanto afferendolo dal polsino con la mano opposta quindi tenerlo nel palmo della mano ancora guantata (A).
- Non toccare a mani nude la superficie esterna dei guanti.
- Rimuovere il secondo guanto afferandolo dall'interno a livello del polso e rovesciarlo competamente, avendo cura di infilare il primo guanto rimosso nel secondo (B).
- Smaltire nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (C).




2. ESEGUIRE LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI




3. OCCHIALI O SCHERMO FACCIALE

- Non toccare la superficie anteriore della protezione oculare.
- Rimuovere il dispositivo afferandolo a livello della fascia girotesta oppure delle aste laterali (D).
- Smaltire nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo o riporlo in luogo utile alla successiva sterilizzazione.



4. SOVRACAMICE MONOUSO

- Non toccare la superficie anteriore e le maniche dell'indumento.
- Sciogliere le allacciature posteriori (E).
- Sfilare il camice dal collo e dalle spalle, toccando soltanto la superficie interna dell'indumento, fino ad aver completamente rivoltato le maniche su loro stesse (F).
- Piegarlo o arrotolare su sè stesso il sovracamice (G) e smaltirlo nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo.



5. FACCIALE FILTRANTE

- Non toccare la superficie anteriore della mascherina/facciale.
- Inclinare leggermente la testa in avanti. Slacciare, oppure sfilare da sopra la testa, prima l'elastico inferiore e poi l'elastico superiore facendo quindi cadere il dispositivo in avanti (H).
- Smaltire nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo (I).



6. CONCLUDERE LA SVESTITIZIONE IGIENIZZANDO ACCURATAMENTE LE MANI

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sequenza per la vestizione


Il tipo di DPI da indossare cambia a seconda del livello di precauzione raccomandato (precauzioni standard, per per contatto, per droplet o per via aerea), pertanto, la modalità di vestizione deve essere adattata ai DPI in uso. In generale, tutti i DPI devono essere correttamente indossati prima di entrare nella stanza del paziente.

1. ESEGUIRE LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI



2. SOVRACAMICE MONOUSO

- Aprire il camice afferrando i lembi in cui sono inseriti i lacci e lasciare cadere il resto per gravità. Tenere l'apertura del camice nella parte posteriore e le cinture all'esterno (A).
- Coprire interamente il dorso, dal collo alle ginocchia e le braccia fino al polso; allacciare il camice posteriormente, con nodo a fiocco, sia a livello del collo che della cintola (B).




3. FACCIALE FILTRANTE

- Posizionare gli elastici del facciale filtrante dietro la testa, uno alla volta: prima quello superiore e poi quello inferiore, posizionandoli rispettivamente sopra e sotto le orecchie (C).
- Far aderire perfettamente il dispositivo al volto, al mento inferiore, coprire tutto il naso e adattare lo stringinaso con entrambe le mani
- Eseguire la prova di tenuta (se facciale filtrante).




4. OCCHIALI O SCHERMO FACCIALE

- Con l'aiuto di entrambe le mani calzare gli occhiali (E) oppure lo schermo facciale (F) dietro la testa.
- Per garantire la tenuta, adattare bene la posizione del dispositivo al proprio volto.



5. GUANTI MONOUSO

- Lavare le mani con acqua e detergente liquido/antisettico o frizionare le mani con prodotto a base alcolica.
- Calzare il guanto a livello dell'apertura e farlo scivolare fino a coprire interamente la mano e il polso (G).



ESEGUIRE SOLO PRATICHE PROFESSIONALI SICURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'OPERATORE E PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DI PATOGENI INFETTIVI

Limitare allo stretto necessario il contatto con il paziente e con l'ambiente a lui circostante.
Non toccare il volto e le mucose con le mani. Non riutilizzare i guanti e cambiarli se lesionati o contaminati.